

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁਢੱਲੇ ਲੱਛਣ

ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਾਲਾ ਜੋ ਥੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਭ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਦੁਖਣਾ ਜੋ ਥੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੰਢ ਹੋਣੀ। ਬਹੇਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੰਦਾ ਦਾ ਪਿੱਲਣਾ।



ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਲ੍ਲਿਟੀ ਰੰਗੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਆਉਣਾ।



ਅੰਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਅੰਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਹੋਣਾ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੱਟਾ ਹੋਣਾ। ਨਿੱਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸਾ ਵਗਣਾ। ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸ ਜਾਣਾ।



ਆਂਤੜੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਪਖਾਂ ਦੋਗਨ ਖੂਨ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ ਜਾਂ ਅਫਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਦਾ ਰਹਿਣਾ।



ਬਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਗਰਭ ਕੋਸ (ਯੋਨੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਆਉਣਾ। ਸੰਭੇਗ ਦੋਰਾਨ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਗਰਭ ਕੋਸ (ਯੋਨੀ) ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਬ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।



ਬਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ (ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਟ)। ਪੇਟ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਮੱਜਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੋਲੇ ਰਿਸੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ।



ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤ ਹੋਣੀ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਧਰ ਬਣਣਾ। ਜੋਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਫੇਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਇਜ ਵਧਣਾ।



ਸਿਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਆਦਾ ਗਲਾ ਫੁੱਲਣਾ। ਸਿਰ ਭਾਗ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਰੂਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਪਰ ਇੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮੇਲ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸੂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੂਲਭੂਤ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ (ਕੋਸ਼ਾਣੂ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਸ / ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਾਰੇ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਟਿਊਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਇਪਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਿਗਨੈਂਟ ਟਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੈਸਿਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਇਨ ਟਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਫੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਡ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ

ਗਰਦਨ :— ਜ਼ਬਾੜੇ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਗਲਾ ਅਤੇ ਗਰਦਨ :— ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗਲਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲੀ ਨੂੰ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੰਢ ਜਾਂ ਗਿਲਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਬੁੱਲ : ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੋ, ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਮਸੂੜੇ :— ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੰਢ, ਗਿਲਟੀ ਜਾਂ ਜਖਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੀਭ :— ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਖਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਗੱਲਾਂ :— ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਉੱਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ।

ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ :— ਚਾਰ ਉੱਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉ।

ਮੂੰਹ ਦਾ ਤਲ :— ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਟਾਂਸਿਲ ਅਤੇ ਗਲਾ :— ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਂਸਿਲ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ।

ਮੂੰਹ ਦੀ ਇਸ ਸਵੈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੰਢ, ਗਿਲਟੀ, ਜਖਮ ਜਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਬਾਇਉਪਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

ਸਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀਜ਼ੀ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ

ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜਰ ਨਲੀ (ਮੁੜਰ ਮਾਰਗ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸਾਨੇ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਖਰੋਟ ਜਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਸ਼



ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ?

ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿਰਿਆਹੀਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਆਰੰਭਕ (ਲੋਕਲਾਇਜਡ) ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ : ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਲੋਕਲੀ ਐਂਡਵਾਸ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ :- ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ (ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ) ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ :- ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਾਇਨ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਹਾਈਪਰਪਲੋਸੀਆਂ (BPH) ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟਰਾਫਿ ਨਾਮਕ ਕੈਂਸਰ-ਰਹਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। BPH ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:-

- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ।
- ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ।
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ (ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ)
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਨ ਆਉਣਾ (ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ)
- ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ :- ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੱਛਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:-

- # ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਵਟ ਹੋਣੀ।
- # ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।
- # ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ।

ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਦੋਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ PSA (ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ-ਸਪੈਸਟਿਕ ਐਂਟੀਜਨ) ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, PSA ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਆਮ ਹ ਪਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ PSA ਪੱਧਰ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਧਾਰਨ PSA ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਇਉਪਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਹੋਣਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

- ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੂਬਰਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਤੀਅਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



CANCER CARE CHARITABLE SOCIETY

www.worldcancercare.co.in

info.worldcancercare@gmail.com


Kot Ram Dass, Opp. Surya Enclave Flyover, Amritsar Bye Pass, Jalandhar.

M: 98887-11733, 98887-11747, 98887-11799, 98887-11781

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ,
ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਜਾਵੇ।



ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹਿਚਾਓ॥



www.worldcancercare.co.in